

2019冠狀病毒病爆發通報及處理

衛生署衛生防護中心

傳染病處

2021年

內容

- 2019冠狀病毒病簡介
- 2019冠狀病毒病院舍爆發
- 院舍爆發通報及處理
- 其他資訊

2019冠狀病毒病簡介

- 病原體
- 「2019冠狀病毒病」是由一種名為嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2的新型冠狀病毒引起的疾病

2019冠狀病毒病簡介

- **病徵(1)**
- 2019冠狀病毒病的最常見病徵包括發燒、乾咳及感到疲乏。
- 其他病徵包括喪失味覺或嗅覺、鼻塞、結膜炎、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛、皮疹、噁心或嘔吐、腹瀉、發冷或暈眩。

2019冠狀病毒病簡介

- **病徵(2)**
- 有些受感染者只有很輕微或不明顯的病徵，
- 有些則可能出現嚴重的徵狀，例如呼吸困難、胸口痛或精神混亂等。
- 年齡較大或有慢性疾病的患者（例如高血壓、心肺疾病、糖尿病或癌症等），有較大機會出現嚴重情況。

2019冠狀病毒病簡介

- **傳播途徑及潛伏期**
- 經呼吸道飛沫傳播是主要的傳播途徑，亦可通過接觸傳播。
- 現時對潛伏期的估計大多是1到14天，最常見的是5至6天左右。

2019冠狀病毒病簡介

- 治理方法
- 主要為支援性治療。

2019冠狀病毒病簡介

- 預防方法
- 現時有多款預防這傳染病的疫苗正在世界衛生組織(WHO)緊急授權下，在全球緊急使用。

2019冠狀病毒病簡介

- **健康建議(1)**
- 市民應減少外出及社交活動，保持適當的社交距離
- 保持個人和環境衛生



2019冠狀病毒病簡介

- **健康建議(2)**
- 如出現病徵（即使症狀輕微）應佩戴外科口罩
- 在人多擠逼的地方逗留時應佩戴外科口罩



2019冠狀病毒病簡介

- **健康建議(3)**
- 經常保持雙手清潔，尤其在(1)觸摸口、鼻或眼之前；(2)進食前；(3)如廁後；(4)觸摸扶手或門把等公共設施後；或(5)當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後
- 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手



2019冠狀病毒病簡介

- **健康建議(4)**
- 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙弄乾
- 雙手洗乾淨後，不要再直接觸摸水龍頭（例如先用抹手紙包裹著水龍頭，才把水龍頭關上）
- 如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手



2019冠狀病毒病簡介

- **健康建議(5)**
- 妥善保養排水渠管和定期（約每星期一次）把約半公升的清水注入每一排水口（**U型隔氣口**）
- 所有地台排水口在不使用時應蓋好
- 如廁時先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌



2019冠狀病毒病簡介

- **健康建議(6)**
- 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。



2019冠狀病毒病簡介

- **健康建議(7)**
- 市民應盡早接種新冠疫苗。
- 即使感染了2019冠狀病毒病，接種疫苗也可保護患者免於併發重症。

2019冠狀病毒病院舍爆發

- 截至2021年8月11日，衛生防護中心錄得62間院舍出現2019冠狀病毒個案。
- 共227院友及83職員確診。

院舍爆發通報及處理

- 衛生署衛生防護中心在接獲2019冠狀病毒病確診個案的通報後，會即時展開流行病學調查及進行接觸者追蹤。
- 中心會盡快安排確診/疑似個案送院治療。
- 中心會聯絡院舍負責人獲取職員及院友資料，並盡快為沒有病徵的密切接觸者安排檢疫，其他接觸者則會進行醫學監察。

院舍爆發通報及處理

• 衛生防護中心所需資料

院舍基本資料:

- ① 名稱
- ② 地址
- ③ 聯絡人姓名、職位、電話
- ④ 患病院友人數 (入院人數)
- ⑤ 患病職員人數
- ⑥ 全院院友人數
- ⑦ 全院職員人數

院舍爆發通報及處理

• 衛生防護中心所需資料

進一步詳細資料

- ① 院友名單 (包括姓名、年齡、性別、身份証號碼、床位、註明是否已入院、回家度假)
- ② 員工名單 (包括姓名、年齡、性別、身份証號碼，註明工作樓層/區域)
- ③ 員工病假記錄
- ④ 員工更期表
- ⑤ 院舍平面圖 (註明房間號數/床號)

從多方面控制爆發

移除源頭

消滅病源

中斷傳播

改善環境因素

加強監測

移除源頭

- 院友
 - 中心會安排確診/疑似個案院友送院隔離治療
- 職員
 - 中心會安排確診/疑似個案職員送院隔離治療

中斷傳播

- 與患者有緊密接觸的院友需接受檢疫(於院舍或合適檢疫中心)
- 避免不同樓層之院友及員工的接觸
- 安排同組員工照顧固定的院友
- 取消集體活動，減少交叉感染
- 加強注意個人衛生 (佩戴口罩，洗手)

中斷傳播

- 院舍的環境未必適合原址檢疫。
- 確診個案的緊密接觸者可能有特殊的醫療需要，例如臥床及使用特定醫療儀器等，他們並不適合入住一般的檢疫中心。
- 政府為安老院舍院友設立了特定臨時檢疫中心：
- **Site X**: 香港傷健協會賽馬會傷健營
- **Site Y**: 伸手助人協會樟木頭老人度假中心
- **Site Z**: 亞洲國際博覽館3號、5號、6號及7號展館

消滅病源、改善環境因素

- 中心會聯絡食物環境衛生署安排院舍環境清潔消毒



消滅病源、改善環境因素

- 職員應按照預防2019冠狀病毒病 (COVID-19) 給安老院舍及殘疾人士院舍職員宿舍的健康指引以預防爆發
- 加強環境消毒 (1:49 稀釋家用漂白水)、清潔，尤其是公用地方及設施，例如樓梯、電梯、大堂、抽風系統等經常打開窗戶，保持室內空氣流通



最後審閱：
二零二一年五月十日

衛生防護中心
Centre for Health Protection

預防 2019 冠狀病毒病 (COVID-19)
給安老院舍及殘疾人士院舍的指引
(暫擬)

甲、疾病資訊及受影響地區

請不時瀏覽以下網頁，查閱有關2019冠狀病毒病及受影響地區的最新資訊：<https://www.coronavirus.gov.hk/chi/index.html>

衛生署建議院舍採取下列預防措施，以降低感染和傳播2019冠狀病毒病的風險。

乙、一般預防措施

一、保持良好個人衛生及免疫力

(a) 正確清潔雙手，尤其在進入院舍時、觸摸眼睛、鼻或口前、進食前、如廁後及觸摸公共設施後，例如升降機按掣板或門柄。此外，職員應在開始工作時、餵餐前、接

加強監測

- 醫學監察期一般為最後接觸個案起計二十八日
- 密切接觸者會最後接觸個案起接受十四日的檢疫；若個案涉及變異病毒株，則由最後接觸個案起接受二十一日的檢疫

總結

- 院舍員工本身不算是高風險群組，但若他們將病毒帶入院舍，體弱住客受到感染，便後果嚴重。
- 要預防2019冠狀病毒病，應保持社交距離，戴口罩及保持手部衛生，以及接種疫苗。
- 一旦出現院舍爆發，應遵從中心指示，儘快提供資料作流行病學調查。
- 早預防，早發現，早隔離，以控制傳染病爆發。
- 詳情請瀏覽2019冠狀病毒病專題網站：
<https://www.coronavirus.gov.hk/chi/index.html>

謝謝!